

Première observation du Picatharte du Cameroun

Picathartes oreas au Congo-Brazzaville

Victor Mamonekene^a et Frédéric Lambert Bokandza-Paco^b

First record of Grey-necked Picathartes *Picathartes oreas* for Congo-Brazzaville. We report the sighting of Grey-necked Picathartes *Picathartes oreas* in Mayombe forest, Congo-Brazzaville, on 22 December 1994. This record constitutes the first for the country and is the southernmost locality for the species, formerly known only from eastern Nigeria to Gabon.

Le 22 décembre 1994, au cours d'une mission dans la forêt du Mayombe, au sud-ouest du Congo-Brazzaville, nous avons observé un Picatharte du Cameroun *Picathartes oreas* le long de la Route Nationale n°1, à environ 20 km à l'ouest de Les Saras (04°22'S 12°22'E). L'oiseau était au sol dans un bas-fond près d'un ruisseau et sautillait entre les pieds d'*Aframomum giganteum* (Zingibéracées) sans s'envoler. Il présentait indiscutablement la taille, la forme et les couleurs caractéristiques du Picatharte du Cameroun et nous avons pu noter le rouge du dessus de la tête et de la nuque, la longue queue foncée et les longues pattes gris-foncé. Le biotope était constitué de forêt vierge avec un sous-bois où dominait *Aframomum giganteum* et, au bord de la route, des espèces de forêt secondaire ayant poussé à la faveur du nettoyage de la voie. Cette partie du Mayombe est peu perturbée en comparaison avec des zones adjacentes; elle fait partie de la Réserve de Biosphère de Dimonika (non fonctionnelle). L'observation a été faite au début de la saison des pluies dans cette partie du Congo.

Ceci constitue la première observation au Congo-Brazzaville du Picatharte du Cameroun, qui jusqu'alors n'était connu que du Nigeria, du Cameroun, de la Guinée Equatoriale et du Gabon (Dowsett-Lemaire & Dowsett 1991, Dowsett 1993, Fry 2000, Borrow & Demey 2001). La localité la plus proche est Mouila, au Gabon, environ 300 km au nord-ouest (Collar & Stuart 1985). L'espèce est considérée comme menacée et sa population est estimée à seulement 10.000 individus (BirdLife International 2000).

Bien que les travaux de Dowsett-Lemaire & Dowsett (1989a, b, 1991) aient considérablement augmenté les connaissances sur l'avifaune du Mayombe, la rencontre fortuite de cette espèce

jamais signalée auparavant sur ce site indique que la forêt cache encore une diversité qui mériterait des recherches plus poussées.

Remerciements

Nous remercions Michel Louette du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique, pour nous avoir encouragés à partager cette information et ouvert sa bibliothèque. Françoise Dowsett-Lemaire et Ron Demey sont remerciés pour leurs commentaires sur le manuscrit.

Bibliographie

- BirdLife International. 2000. *Threatened Birds of the World*. Barcelona: Lynx Edicions & Cambridge, UK: BirdLife International.
- Borrow, N. & Demey, R. 2001. *Birds of Western Africa*. London, UK: Christopher Helm.
- Collar, N. J. & Stuart, S. N. 1985. *Threatened Birds of Africa and Related Islands*. Cambridge, UK: International Council for Bird Conservation & Gland: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.
- Dowsett, R. J. 1993. Afrotropical avifaunas: annotated country checklists. Congo. *Tauraco Res. Rep.* 5: 189–194.
- Dowsett-Lemaire, F. & Dowsett, R. J. 1989a. Enquête faunistique dans la forêt du Mayombe (Dimonika): itinéraire, résultats et recommandations. *Tauraco Res. Rep.* 2: 1–4.
- Dowsett-Lemaire, F. & Dowsett, R. J. 1989b. Liste commentée des oiseaux de la forêt du Mayombe (Congo). *Tauraco Res. Rep.* 2: 5–16.
- Dowsett-Lemaire, F. & Dowsett, R. J. 1991. The avifauna of the Kouilou Basin in Congo. *Tauraco Res. Rep.* 4: 189–239.
- Fry, C. H. 2000. Grey-necked Picathartes *Picathartes oreas*. In Fry, C. H., Keith, S. & Urban, E. K. (eds.) *The Birds of Africa*. Vol. 6. London, UK: Academic Press.

^a*Institut de Développement Rural, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo. Email: mamonekene@hotmail.com*

^b*Direction de la Faune et des Aires Protégées, Ministère des Eaux et Forêts et de l'Environnement, Brazzaville, Congo.*

Reçu le 3 février 2005; révision acceptée le 25 mai 2005

Note de la rédaction. Bien que R. C. Fotso (1993. Contribution à l'étude de la biologie du Picatharte chauve du Cameroun *Picathartes oreas*. *Proc. VIII Pan-Afr. Orn. Congr.* 431–437) affirme que le domaine de l'espèce s'étend jusqu'au nord-est du Congo, à la frontière avec le Cameroun, aucune observation n'est connue de cette zone jusqu'à présent. L'observation dans le Mayombe, présentée ci-dessus, constitue donc bien la première pour le Congo-Brazzaville.



AMERICAS & AUSTRALIA

GUAPI ASSU BIRD LODGE - TROPICAL BIRDING'S NEW LODGE IN THE MIDST OF THE ATLANTIC RAINFORESTS OF SE BRAZIL, ONLY 70KM FROM RIO.

SE ATLANTIC ENDEMICS, PANTANAL, SOA NOVA, ECUADOR, NW ECUADOR, ANDES EAST SLOPE, SOUTHERN ECUADOR, CUBA, VENEZUELA, PERU & AUSTRALIA.

SET-DEPARTURE AND CUSTOMISED TRIPS FOR ALL DESTINATIONS
FOR MORE INFORMATION EXPLORE OUR CATALOGUE ON-LINE
CALL US TOLL FREE AT 1-800-348-5941

info@tropicalbirding.com www.tropicalbirding.com Fax: +593-2-290-9753 Tel: +593-9-923-1314

TROPICAL BIRDING



AFRICA AND ASIA

MADAGASCAR, NAMIBIA & BOTSWANA,
SOUTH AFRICA, ZAMBIA, CAMEROON,
ETHIOPIA, TANZANIA, GABON, SAO TOME &
PRINCIPE, UGANDA, INDIA, TAIWAN
AND BORNEO.

